

08 Scherrasen & ruderale Wiesen

GÄNSEBLÜMCHEN
MIT HONIGBIENE



Das Wichtigste im Überblick:

Scherrasen sind Rasenflächen, die alle zwei bis drei Wochen gemäht werden. Oft wurden sie mit Saatgutmischungen aus wenigen Grasarten eingesät, können sich jedoch im Laufe der Zeit mit bunt blühenden Arten anreichern. Wiesen hingegen werden wesentlich seltener gemäht und sind im Siedlungsgebiet v. a. auf Bauerwartungsland und in kleineren Baulücken zu finden. In Siedlungsgebieten werden sie auch als „ruderale Wiesen“ bezeichnet. Sowohl Scherrasen als auch Wiesen sind wichtige Nahrungsquellen für Insekten.

Rasenflächen in Siedlungsbereichen, die in der Regel alle zwei bis drei Wochen gemäht werden, um sie möglichst kurz und „gepflegt“ zu halten, werden als „Scherrasen“ bezeichnet. Häufig wurden sie mit genormten Saatgutmischungen aus wenigen Grasarten eingesät. Wenn Du Dir jedoch einen langjährig gemähten Rasen anschaust, wird Dir auffallen, dass sich die ursprüngliche Artenzusammensetzung im Laufe der Zeit verändert hat und nun auch bunt blühende Kräuter dazugehören. Typische Arten sind Gewöhnlicher Hornklee, Gänseblümchen, verschiedene Ehrenpreis-Arten, Kriechender Hahnenfuß und Kleinköpfiger Pippau. Gealterte Scherrasen bieten nicht nur Pflanzenarten ein Zuhause, sondern dienen auch als Nahrungsquelle für (Wild-)Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten.



KRÄUTERREICHER RASEN



KLEINKÖPFIGER PIPPAU




KRIECHENDER GÜNSEL



GEWÖHNLICHER HORNKLEE

Neben Rasenflächen gibt es mancherorts auch Pflanzenbestände, die unseren landwirtschaftlichen Wiesen ähneln. Im Gegensatz dazu sind sie jedoch meist deutlich artenärmer und enthalten viele Ruderalarten. Ruderalarten sind konkurrenzstarke Arten, die gehäuft an oft gestörten Plätzen vorkommen. Dazu gehört z. B. die Acker-Kratzdistel. Oft handelt es sich bei den wiesenartigen Beständen tatsächlich um zuvor landwirtschaftlich genutzte Grünlandbestände. Sie finden sich innerhalb des Siedlungsgebiets vor allem auf Bauerwartungsland und in kleineren Baulücken.



WIESENÄHNLICHE
RASENFLÄCHE

Impressum

Commune de
Steinfort

SICONA
Naturschutzesyndikat

08 Les pelouses et les prairies rudérales

PÂQUERETTE AVEC UNE
ABEILLE DOMESTIQUE



L'essentiel en un coup d'oeil :

Le gazon est une pelouse tondues toutes les deux à trois semaines. Ces surfaces ont souvent été ensemencées de mélanges de semences composés de peu de graminées qui, au fil du temps, peuvent s'enrichir d'espèces florissantes multicolores. Les prairies, en revanche, sont bien moins souvent tondues. En milieu urbain, elles se situent principalement sur des terrains en attente de construction et dans les petites parcelles vides. En milieu urbain, elles sont aussi qualifiées de « prairies rudérales ». Tant les pelouses que les prairies constituent des sources de nourriture importantes pour les insectes.

Les pelouses en milieu urbain, qui d'habitude sont tondues toutes les deux à trois semaines afin de les maintenir aussi courtes et « entretenues » que possible, sont qualifiées de « gazons ». Souvent, elles ont été ensemencées avec des mélanges de semences standardisés composés de peu de graminées. Cependant, sur un gazon tondu depuis plusieurs années, la composition initiale des espèces a évolué au fil du temps et elle comporte désormais aussi des plantes à floraison multicolore. Des espèces typiques incluent le lotier corniculé, la pâquerette, diverses espèces de vénérables, la renoncule rampante et la crêpe à tige capillaire. Les gazons anciens abritent non seulement un plus grand nombre d'espèces végétales, mais servent également de source de nourriture pour les abeilles sauvages, les papillons et d'autres insectes.



GAZON RICHE EN HERBES



CRÉPIDE NAINNE




BUGLE RAMPANTE



LOTIER CORNICULÉ

Outre les pelouses, on trouve par endroits des formations végétales qui ressemblent à nos prairies agricoles. En revanche, elles sont souvent nettement plus pauvres en espèces et contiennent de nombreuses « espèces rudérales ». Ce sont des espèces compétitives, qui se trouvent davantage dans des lieux soumis à de fréquentes perturbations, comme les zones urbaines. C'est notamment le cas du cirse des champs. Ces peuplements de type prairie sont souvent d'anciens pâturages utilisés à des fins agricoles. Ils se trouvent principalement en milieu urbain sur des terrains à bâtir et dans les petites parcelles vides.



PELOUSE
RESSEMBLANT À
UNE PRAIRIE

Mentions légales

